

S. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

S01. OFTALMOLÓGICOS

S01A. OFTALMOLÓGICOS ANTIINFECCIOSOS

	CLORANFENICOL (OFTAL)	—	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras y los beneficios potenciales superan los riesgos.
	CLORTETRACICLINA (OFTAL)	D (sistémica)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	NEOMICINA (OFTAL)	—	No hay información en el embarazo.
	OXITETRACICLINA (OFTAL)	D (sistémica)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	GENTAMICINA (OFTAL)	C (sistémica)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	TOBRAMICINA (OFTAL)	B(D sistémica)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	FUSIDICO, ACIDO (OFTAL)	—	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	ERITROMICINA (OFTAL)	—	Uso aceptado.
	KANAMICINA (OFTAL)	D (sistémica)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	AZITROMICINA (OFTAL)	—	Usar con precaución.
	Tras su administración oftálmica no se detecta en sangre.		
	SULFACETAMIDA	—	No hay información en el embarazo.
	ACICLOVIR (OFTAL)	C (sistémico)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	GANCICLOVIR (OFTAL)	—	No se recomienda su administración.
	Las mujeres en edad fértil deben usar medidas anticonceptivas eficaces.		

	OFLOXACINO (OFTAL)	C	Cuando sea imprescindible y si el beneficio potencial supera el posible riesgo.
	NORFLOXACINO (OFTAL)	C (sistémico)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	CIPROFLOXACINO (OFTAL)	C (sistémico)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	LOMEFLOXACINO (OFTAL)	—	Si el beneficio potencial supera el posible riesgo.
	MOXIFLOXACINO (OFTAL)	—	Uso aceptable.
No se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos con el moxifloxacino oftálmico; no obstante, se alcanzan bajos niveles plasmáticos.			

S01B. OFTALMOLÓGICOS ANTIINFLAMATORIOS

S01BA. OFTALMOLÓGICOS ANTIINFLAMATORIOS: CORTICOSTEROIDES

El uso de dosis moderadas durante periodos de tiempo limitados no parece conllevar efectos significativos hacia el feto, pero el uso a dosis elevadas o durante periodos de tiempo prolongados, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.

	BETAMETASONA (OFTAL)	—	No hay información en el embarazo.
	CORTISONA (OFTAL)	—	No hay información en el embarazo.
	FLUDROCORTISONA (OFTAL)	—	No hay información en el embarazo.
	PREDNISONA (OFTAL)	—	No hay información en el embarazo.
	DEXAMETASONA (OFTAL)	C (sistémico)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	FLUOROMETOLONA (OFTAL)	C (sistémico)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.

	HIDROCORTISONA (OFTAL)	C (sistémico)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	PREDNISOLONA (OFTAL)	C (sistémico)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	RIMEXOLONA	—	Si el beneficio potencial supera el posible riesgo.

S01BC. OFTALMOLÓGICOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

Teniendo en cuenta los efectos nocivos de los fármacos inhibidores de prostaglandinas sobre el sistema cardiovascular fetal, y que algunos AINE orales a dosis tóxicas maternas producen gestación prolongada y retraso del parto, no se recomienda el uso durante el tercer trimestre. El uso de este medicamento en los otros trimestres sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.

	DICLOFENACO (OFTAL)	B	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras y los beneficios superan los riesgos. No recomendado en 3º trimestre.
	KETOROLACO (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras y los beneficios superan los riesgos. No recomendado en 3º trimestre.
	PRANOPROFENO (OFTAL)	—	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras y los beneficios superan los riesgos. No recomendado en 3º trimestre.

S01E. ANTIGLAUCOMA Y MIÓTICOS

	APRACLONIDINA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
--	----------------------	----------	--

	BRIMONIDINA	B	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	PILOCARPINA (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	ACETILCOLINA, CLORURO	—	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	BRINZOLAMIDA	—	No debe utilizarse a menos que sea estrictamente necesario.
	ACETAZOLAMIDA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras, especialmente en 1º trimestre.
	DICLOFENAMIDA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	DORZOLAMIDA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	TIMOLOL (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras y los beneficios superan los riesgos.
En caso de uso se recomienda vigilar a los neonatos controlando frecuencia cardiaca y glucemia.			
	BETAXOLOL (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	LEVOBUNOLOL	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	CARTEOLOL (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	LATANOPROST	C	Evitar su administración.
Las mujeres en edad fértil deberán tomar las medidas anticonceptivas adecuadas para evitar quedarse embarazadas mientras lo utilicen.			
	BIMATOPROST	C	Evitar su administración.
Las mujeres en edad fértil deberán tomar las medidas anticonceptivas adecuadas para evitar quedarse embarazadas mientras lo utilicen.			
	TRAVOPROST	C	Evitar su administración.
Las mujeres en edad fértil deberán tomar las medidas anticonceptivas adecuadas para evitar quedarse embarazadas mientras lo utilicen.			
	TAFLUPROST	C	Evitar su administración.
Las mujeres en edad fértil deberán tomar las medidas anticonceptivas adecuadas para evitar quedarse embarazadas mientras lo utilicen.			

	GLICEROL (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
--	-------------------------	----------	--

S01F. MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS

	CICLOPENTOLATO	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	ATROPINA (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	ESCOPOLAMINA (OFTAL)	—	No hay información en el embarazo.
	HOMATROPINA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	TROPICAMIDA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	FENILEFRINA (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.

S01G. DESCONGESTIONANTES Y ANTIALÉRGICOS

	NAFAZOLINA (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	No se espera daño fetal con el uso de dosis moderadas durante corto tiempo (no más de 3 días).		
	OXIMETAZOLINA (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	No se espera daño fetal con el uso de dosis moderadas durante corto tiempo (no más de 3 días).		
	CROMOGLICICO, ACIDO (OFTAL)	B	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	La cantidad absorbida tras administración oftálica no parece ser muy elevada.		
	LEVOCABASTINA (OFTAL)	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	ESPAGLUMICO, ACIDO	—	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	NEDOCROMILO (OFTAL)	B	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.

	LODOXAMIDA (OFTAL)	B	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	EMEDASTINA	B	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
	KETOTIFENO (OFTAL)	C	Usar con precaución.
	Los niveles sistémicos tras administración ocular son mucho más bajos que después de su uso oral.		
	OLOPATADINA	B	Usar con precaución.
	EPINASTINA	—	Usar con precaución.

S01H. ANESTÉSICOS LOCALES

	OXIBUPROCAINA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
--	----------------------	----------	--

S01J. AGENTES PARA DIAGNÓSTICO

	FLUORESCEINA	C	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
--	---------------------	----------	--

S01K. COADYUVANTES QUIRÚRGICOS

	CARMELOSA (OFTAL)	—	Uso aceptado.
	HIPROMELOSA	—	No hay información en el embarazo.

S01L. AGENTES PARA DESÓRDENES VASCULARES OCULARES

	PEGAPTANIB	B	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras y los beneficios superan los riesgos.
	RANIBIZUMAB	—	Si el beneficio potencial supere el posible riesgo.
	Las mujeres en edad fértil deberán utilizar un método anticonceptivo eficaz mientras dure el tratamiento.		

	VERTEPORFINA	—	Si el beneficio potencial supera el posible riesgo.
--	---------------------	---	---

S01X. OTROS OFTALMOLÓGICOS

	CROMOCARBODIETILAMINA (OFTAL)	—	Uso aceptable.
	HAMAMELIS (HAMAMELIS VIRGINIANA) (OFTAL)	—	No hay información en el embarazo.
	VASELINA (OFTAL)	—	Uso aceptado.
	SODIO, CLORURO (OFTAL)	—	Uso aceptado.
	EDETICO, ACIDO	—	Uso aceptable.
	ALCOHOL POLIVINILICO	—	Uso aceptado.

S02. OTOLÓGICOS

S02A. OTOLÓGICOS ANTIINFECCIOSOS

	CIPROFLOXACINO (OTICO)	C (sistémica)	Si no hay alternativas terapéuticas más seguras.
No es esperable una absorción sistémica tras su administración por vía ótica.			

S02B. OTOLÓGICOS CORTICOSTEROIDES

Es poco probable que se produzca absorción a nivel sistémico. El uso de dosis moderadas durante periodos de tiempo limitados no parece conllevar efectos significativos hacia el feto, pero debería evitarse el uso prolongado a dosis altas.

	DEXAMETASONA (OTICO)	—	No hay información en el embarazo.
	FLUDROCORTISONA (OTICO)	—	No hay información en el embarazo.
	FLUOCINOLONA, ACETONIDO (OTICO)	—	Si el beneficio potencial supera el posible riesgo.
	HIDROCORTISONA (OTICO)	—	Uso aceptable.

RESUMEN DEL GRUPO

USO ACEPTADO

ALCOHOL POLIVINILICO
 CARMELOSA (OFTAL)
 ERITROMICINA (OFTAL)
 SODIO, CLORURO (OFTAL)
 VASELINA (OFTAL)

USO ACEPTABLE

AZITROMICINA (OFTALMICA)
 CROMOCARBODIETILAMINA (OFTAL)
 EDETICO, ACIDO
 HIDROCORTISONA (OTICO)
 MOXIFLOXACINO (OFTAL)

SI NO HAY ALTERNATIVAS

ACICLOVIR (OFTAL)
 ATROPINA (OFTAL)
 BRIMONIDINA
 CICLOPENTOLATO
 CIPROFLOXACINO (OFTAL)
 CIPROFLOXACINO (OTICO)
 CROMOGLICICO, ACIDO (OFTAL)
 DEXAMETASONA (OFTAL)
 EMEDASTINA
 EPINASTINA
 FLUORESCEINA

FLUOROMETOLONA (OFTAL)
 GENTAMICINA (OFTAL)
 GLICEROL (OFTAL)
 HIDROCORTISONA (OFTAL)
 HOMATROPINA
 KETOTIFENO (OFTAL)
 LODOXAMIDA (OFTAL)
 NAFAZOLINA (OFTAL)
 NEDOCROMILO (OFTAL)
 NORFLOXACINO (OFTAL)
 OLOPATADINA
 OXIBUPROCAINA
 OXIMETAZOLINA (OFTAL)
 PEGAPTANIB
 PREDNISOLONA (OFTAL)
 TOBRAMICINA (OFTAL)
 TROPICAMIDA

CON EXTREMADA CAUTELA

ACETAZOLAMIDA
 ACETILCOLINA, CLORURO
 APRACLONIDINA
 BETAXOLOL (OFTAL)
 CARTEOLOL (OFTAL)
 CLORANFENICOL (OFTAL)
 CLORTETRACICLINA (OFTAL)
 DICLOFENACO (OFTAL)
 DICLOFENAMIDA
 DORZOLAMIDA

ESPAGLUMICO, ACIDO
FENILEFRINA (OFTAL)
FLUOCINOLONA, ACETONIDO (OTICO)
FUSIDICO, ACIDO (OFTAL)
KANAMICINA (OFTAL)
KETOROLACO (OFTAL)
LEVOBUNOLOL
LEVOCABASTINA (OFTAL)
LOMEFLOXACINO (OFTAL)
OFLOXACINO (OFTAL)
OXITETRACICLINA (OFTAL)
PILOCARPINA (OFTAL)
PRANOPROFENO (OFTAL)
RANIBIZUMAB
RIMEXOLONA
TIMOLOL (OFTAL)
VERTEPORFINA

FLUDROCORTISONA (OTICO)
HAMAMELIS (HAMAMELIS VIRGINIANA) (OFTAL)
HIPROMELOSA
NEOMICINA (OFTALMICA)
PREDNISONA (OFTAL)
SULFACETAMIDA

CONTRAINDICADOS

BIMATOPROST
BRINZOLAMIDA
GANCICLOVIR (OFTAL)
LATANOPROST
T AFLUPROST
TRAVOPROST

SIN INFORMACIÓN

BETAMETASONA (OFTAL)
CORTISONA (OFTAL)
DEXAMETASONA (OTICO)
ESCOPOLAMINA (OFTAL)
FLUDROCORTISONA (OFTAL)